

リブタヨ+ペメトレキシド維持療法

【呼吸器科】 164 【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名: 印	
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	-8	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
リブタヨ		↓	休薬	休薬	
ペメトレキセド		↓	休薬	休薬	
パンビタン末(経口)					
メコバラミン注(筋注)		↓			

初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。

メコバラミン注(ビタミンB12): 初回投与の少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与する。その後、9週毎(3コース毎)に1回投与する。

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②		●リブタヨ【 】mg 生食 100mL 30分
③		生食 50mL 10分
④		●ペメトレキセド【 】mg 生食 100mL 10分
⑤		生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
リブタヨ	350mg/Body	
ペメトレキセド	500 mg/m ²	mg/Body

薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- NSAIDsとの併用は注意して下さい。
- 1週間以上前から葉酸を服用していることと、ビタミンB12の筋肉内注射投与を受けたことを確認すること。
- リブタヨの血管外漏出時は、非炎症性抗がん剤としてマニュアルに沿った対応をすること。