

テセントリク+パクリタキセル(PTX)+カルボプラチナ(CBDCA)【60分】療法

【呼吸器科】167【胸腺癌】 (第 コース目)

■エンボス

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン

下記が1コースの投与スケジュール：3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
テセントリク	↓	休薬	休薬	
パクリタキセル	↓	休薬	休薬	
カルボプラチナ	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①	生食 50mL	10分
②	●テセントリク【 】mg 生食 250mL	1時間
※③	生食 100mL	1時間
※③	内服薬レスタミン10mg 5T アロカリス注235mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A ガスター注20mg 1A グラニセトロンバッグ 100mL	
※③	同時に 側管より	30分
④	●パクリタキセル【 】mg 5%ブドウ糖 500mL	3時間
⑤	●カルボプラチナ【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間
⑥	生食 50mL	10分フラッシュ

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
テセントリク	1200 mg/body
パクリタキセル	200 mg/m ²
カルボプラチナ	AUC=6

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- パクリタキセル投与中はアレルギー発現に注意すること。特に投与開始10分以内は頻回に観察すること。
- 過敏症予防の前投薬を終了して30分以上経っているのを確認してからパクリタキセルを投与すること。
- 4~6コース実施。